



Kỹ thuật chăm sóc ĐIỀU ra hoa – đậu trái

MAI XUÂN

cho sản lượng & chất lượng cao

Trong vụ Điều năm 03-04 đang cho thu trái, phần lớn các vườn Điều có đầu tư phun thuốc đậu trái + thuốc sâu bệnh đã cho sản lượng và chất lượng vượt trội. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhà vườn phun thuốc rất nhiều lần, trái có đậu nhiều nhưng lại bị héo tươi khá nhiều. Vì vậy các nhà vườn nên quan tâm và xem xét kỹ quá trình kỹ thuật giúp cây ra hoa – đậu trái để Điều cho sản lượng và chất lượng cao. Kỹ thuật chăm sóc Điều cụ thể như sau:

I. CHĂM SÓC SAU THU HOẠCH:

Lâu nay nhà vườn thường ít chăm sóc Điều sau khi thu hoạch, như vậy thì vụ hoa tới lại vất vả lo lắng cho sự ra hoa – đậu trái. Nhà vườn nên chăm sóc cơ bản như sau:

1. Bón phân, tưới nước:

- Sau thu hoạch (khoảng tháng 4-5), bón khoảng 2 kg Đầu trâu 16-8-8 hoặc 2 kg NPK 16-16-8 / cây 5-6 tuổi. Có thể bón bằng phân đơn trộn chung với nhau: trộn đều 25 kg Urê + 65 kg Super lân + 10 kg kali đỏ, rồi bón 3 kg cho 1 cây 5-6 tuổi. **Cách bón:** xới đất quanh gốc tạo thành đường vành khăn rộng 20-30 cm, sâu 5-10 cm theo đường chiều vành tán cây, rải đều phân, lấp lại. Nếu không đủ công thì có thể cuốc quanh gốc 5-6 lỗ, cũng sâu 5-10 cm và theo tán cây rồi bón phân vào lỗ và lấp đất lại. Đất bằng hay đất dốc thì cách bón vẫn như nhau.

- Bón phân xong gặp mưa thì tốt, nếu không thì cố gắng tưới nước 1-2 lần cho phân tan.

2. Cắt tỉa cành: Nên dùng kéo hoặc cưa cắt tỉa bỏ các cành sâu bệnh, cành mọc xà dựng đất, cành mọc đâm vô phía trong tán cây.

3. Phun thuốc: nếu thấy có sâu bọ nhiều (bọ vòi voi, bọ xít muỗi, sâu đục cành...) thì phun thuốc phòng trừ sâu như: Basudin, Bi-58, Cyrux, Cymerin, Sec Sai gòn...

II. HỖ TRỢ VƯỜN ĐIỀU RA HOA SỚM, ĐỒNG LOẠT:

Cây điều có đặc điểm là sau khi rụng lá sẽ đâm ra đợt lá non mới. Khi đợt lá mới này được 5-13 lá sẽ xuất hiện chồi hoa ở đỉnh đợt. Do vậy, để vườn điều ra hoa sớm, ra hoa đồng loạt nhà vườn nên tiến hành 3 bước sau:

1. Bước 1: Bón phân đón ra hoa:

Bón thêm 1 lần vào cuối mùa mưa (khoảng tháng 9) để đón ra hoa và nuôi trái sau này. Lượng bón và cách bón tương tự như lần bón sau thu hoạch.

2. Bước 2: Xử lý rụng lá:

- Khi vườn điều chuẩn bị rụng lá: lá chuyển từ màu xanh sang màu vàng nâu thì dọn sạch cỏ trong vườn để dễ cho việc quét gom lá và thu lượm trái sau này.

- Làm rụng lá: khi lá có màu vàng nâu pha 25 g Thiô-rê (hoặc 160 g KNO₃) / 8 lít phun 1 lần cho điều. Sau phun lá rụng nhanh và đợt non sẽ đâm ra mạnh sau đó 3-4 ngày => **Chú ý:** việc làm rụng lá này nhà vườn nên cẩn thận, nhất là ở các vườn cây lợt chột, phun nặng đô nếu gặp đợt lá non thì dễ gây cháy lá non. Cho nên trong thực tế nhà vườn có thể bỏ qua việc làm rụng lá, quan trọng là làm bước 3.

- Sốt lá rụng nhà vườn nên gom lại từng đống nhỏ, cách nhau 4-5 m, đốt un khói (ít có ngọn lửa) vào buổi sáng khi lá còn ẩm để khói bốc lên xua đuổi bọ xít muỗi và côn trùng gây hại đợt điều non. Nên đốt trước khi điều ra hoa vì khói này có khí Etylen nên còn góp phần giúp cho điều ra hoa tốt hơn.

3. Bước 3: Phun thuốc kích thích ra hoa và bảo vệ đợt lá:

Khi đa số đợt mới trong vườn có 5-6 lá: pha 15 g F.Bo-Bột Ra Hoa Chuyên dùng cho ĐIỀU

cộng thuốc trừ sâu Cypermethrin (tên là Sherbush, Cymerin, Pycythin...) / 8 lít phun sương 1 lần => sau phun khoảng hơn 10 ngày cây sẽ ra hoa đồng loạt (hoa này sẽ mập, mạnh và dễ đậu quả). Nếu không phun thuốc **F.Bo** thì đợt ra hoa ngắn, ốm yếu, không đồng loạt.

Chú ý: - Đối với các cây Điều tơ, nhất là Điều cao, sản để giúp chúng ra hoa đồng loạt, khi gặp thời tiết lạnh và khô, nhà vườn phun thuốc **F.Bo-Bột Ra Hoa** + thuốc trừ sâu cho cây 2 lần, cách nhau 5-7 ngày sẽ giúp cây ra hoa tốt mà không cần rụng lá như các cây Điều lão.

- Khi cây đang rụng lá và nhú đợt non mới thì phun thuốc **F.Bo-Bột Ra Hoa** ngay lúc đó, cây sẽ rụng lá nhanh rồi nhú đợt non và hoa đồng loạt.

III. TĂNG ĐẬU TRÁI & HẠN CHẾ RỤNG HOA:

Điều ra hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu trái rất thấp. Thường do: rụng hoa sinh lý; bệnh hại: phấn trắng, thán thư và bọ xít muỗi phá hại. Để tăng đậu trái cần phun thuốc 3 lần:

- lần 1 - khi 80% phát hoa vừa nhú 10 cm: pha 35 ml **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** (2 nắp lưng) + thuốc trừ sâu Cypermethrin / 8 lít phun sương đều cây.
- lần 2 - khi 80% phát hoa dài hết cỡ, bắt đầu có hoa nở: pha 35 ml **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** + 10 ml thuốc Carbendazim (tên là Carbenzim, Vicarben, Arin, Helocarb 500 HF...) / 8 lít phun sương đều cây. **Đặc biệt:** nếu gặp mưa hay sương bất chợt thì phun thuốc như trên rất hiệu quả và cần phun thêm 1 lần nữa nếu mưa kéo dài.
- lần 3 - khi 80% hạt to bằng hạt sen: pha 40 ml **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** + thuốc trừ sâu Cypermethrin / 8 lít phun sương đều cây.

Chú ý:

- Đối với vườn điều ra hoa lọt chọt, có cành chưa trở, có cành mới trở hoa 5-6 cm pha 15 g **F.Bo-Bột Ra Hoa** + 35 ml thuốc **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** + 10 ml Carben / 8 lít phun sương đều cây 2 lần, cách nhau 5-7 ngày để giúp cành chưa trở ra hoa nhanh và cành đã trở đậu trái nhiều. Tức pha 1 gói 400 g **F.Bo-Bột Ra Hoa** + 300 ml Carben + 1 chai 1 lít thuốc **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** trong thùng 220 lít, phun bằng máy.

- Thông thường khi Điều ra hoa-đậu trái gặp sương nhiều hoặc mưa ẩm thì bị thán thư nặng làm khô và rụng hoa cũng như trái non nhiều. Khi đó nhà vườn cần thiết phải phun thuốc **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** + Carbendazim để phòng trừ bệnh thán thư cũng như hạn chế rụng hoa và trái non. Tuy nhiên, khi thời tiết khô vẫn bị rụng hoa và trái non đó là do Điều thiếu dinh dưỡng nuôi trái và có thể bị bệnh phấn trắng gây ra (có những đốm phấn mịn, màu trắng xám). Khi đó cần phun thuốc như trên để hạn chế tác hại cho hoa và trái non.

- Từ khi Điều ra hoa cho đến trước thu 2 tuần, có điều kiện nên tưới nước đều đặn cho Điều. Được tưới nước Điều sẽ tăng đậu trái và tăng sản lượng cũng như chất lượng hạt Điều.

III. NUÔI TRÁI & XỬ LÝ TRÁI BẤT THƯỜNG:

- Khi trái thật to bằng ngón tay út, pha 35 ml **DƯỠNG TRÁI** / 8 lít, phun sương đều chùm trái và cả cây giúp trái Điều to nhanh, chắc nặng, sáng đẹp và tỷ lệ đạt loại 1 nhiều.

- Nếu bị hiện tượng rụng trái, da nhẵn do bọ xít muỗi chích: pha thuốc trừ sâu Cypermethrin + 40 ml **ĐẬU TRÁI** - Chuyên dùng cho **ĐIỀU** / 8 lít, phun sương đều chùm trái và cả cây.

- Nếu trái héo tươi do thiếu dinh dưỡng (nhất là Ca) và bệnh thán thư: pha 15 g **Food-MX4 (10-0-35+3Ca)** + 10 ml Carbendazim / 8 lít phun sương đều chùm trái và cả cây.

- Muốn có hạt Điều thu hoạch sớm và bán được giá cao thì khi phần lớn trái to bằng ngón tay cái, pha 30 g **Food-MX4 (10-0-35+3Ca)** hoặc 40 g **KNO₃** + 40 ml **DƯỠNG TRÁI** / 8 lít phun 1 lần để hạt Điều to nhanh, chắc nặng và thu hoạch trước cả tuần lễ.

Hộp thư Tư vấn Kỹ thuật: 56/103-Cây trâm-P.11-Gò Vấp-Tp.HCM ĐT: (08) 9967 677 - 5894 930

KS Trúc: 0913.909 800 - KS Chương: 0918.763 851

Mai Xuân - Đi lên cùng nhà nông! (tháng 4-2004)