

## Kỹ thuật trồng cà tím F1



*Ảnh minh họa*

### 1. Đặc

### điểm

Giống cà tím lai có thời gian sinh trưởng từ 140 – 150 ngày, cây cao từ 80 100 cm, chịu hạn tốt, không chịu úng, dày cùi, ít hạt, thơm ngon, năng suất đạt trung bình từ 50 – 60 tấn/ha, thâm canh đạt khoảng 75 tấn/ha. Sau trồng 2 tháng cho quả, quả dài từ 25 – 30 cm, vỏ màu tím đẹp.

Thời vụ : trồng vụ xuân gieo hạt từ 15 tháng 1, trồng 20/2; hè thu gieo hạt 05/6, trồng 10/7.

### 2. Chuẩn bị vườn ươm.

Làm đất tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại, bón 700 kg phân chuồng hoai mục, 20 kg vôi bột, 10 kg supe lân/ 360 m<sup>2</sup>, bừa trộn đều, lên luống rộng 1,2m, cao 30 cm, phun thuốc diệt kiến, mối, nấm.

Ngâm hạt giống với nước ấm trong 4 giờ, sau đó vớt ra rửa sạch với nước thường, trộn với tro bếp hoặc đất bột khô đem gieo. Lượng hạt giống để có cây trồng cho cho 360 m<sup>2</sup> cần 150 gam hạt. gieo xong phủ 1 lớp trấu xay dày 1 cm, hàng ngày tưới ẩm.

Khi cây con mọc cao từ 7 – 8 cm nhỏ đem trồng ra ruộng.

### **3. Chuẩn bị đất, trồng cây.**

Chọn đất cao ráo, không bị ngập úng, đất không nhiễm độc, không nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ PH từ 6,0 – 6,5, có nguồn nước sạch để tưới chủ động; tốt nhất là đất phù sa ven sông, đất đồng bằng màu mỡ tơi xốp giàu mùn hữu cơ.

Làm đất.

Đối với đất trồng trên các chân ruộng bằng phẳng cần cày sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại. Bón 600 kg vôi bột + 20 tấn phân chuồng đã ủ hoai mục, + 700 kg su pe lân, bừa trộn đều với đất.

Lên luống rộng 1,2 m-1,4m, cao 25 cm, trồng hàng đôi, rộng 0,7 m luống đơn, rãnh rộng 30 cm.

- Khoảng cách trồng: Hàng đôi cây cách cây 70cm, cách hàng 60 cm, trồng nanh sáu.

Hàng đơn Cây cách cây 70cm.

- Cây giống đem trồng không nên tưới nước cho cây 7 ngày, chỉ tưới ẩm 5 giờ trước lúc nhỏ cho cây không bị đứt rễ và nhanh hồi xanh.

### **4. Chăm sóc:**

Trong 10 ngày đầu sau trồng tưới nước sạch ngày 1 lần, kết hợp trồng dặm những cây bị chết.

Sau khi cây bén rễ hồi xanh pha loãng đạm ure tưới như môi cho cây.

Bón thúc: Lượng phân bón cho 360 m<sup>2</sup>.

- Bón thúc lần thứ nhất khi cây trồng khoảng 20 ngày: Đạm 1,5kg + Kali 1,5kg

- Bón thúc lần 2 khi cây trồng khoảng 35 ngày : Đạm 2kg + Kali 2kg

- Bón thúc lần 3 khi cây chuẩn bị ra hoa: Đạm 2kg + Kali 2kg

- Bón thúc lần 4 khi cây trồng ra quả con rộ: Đạm 2kg + Kali 2kg

- Bón bổ sung sau mỗi lần thu hái: 1,5kg Đạm , 1,5kg Kali.

Sau khi trồng cây con 1 tháng xới phá váng vun gốc để thúc cho bộ rễ phát triển, tăng cường sức giữ nước, giữ màu của đất, chống đổ cho cây, kết hợp diệt cỏ dại.

### **Tưới nước và tỉa cành:**

Trong suốt thời gian sinh trưởng của cây luôn giữ độ ẩm trong đất. Theo dõi thời tiết mưa, nắng để có kế hoạch tưới nước cho cây . Lúc cà có quả non tưới nhiều hơn. Khi cây bắt đầu có quả, cần tỉa bỏ hết những nhánh dưới chùm hoa thứ nhất. các cành này thường mọc thẳng đứng làm cho tán cây rậm rạp, thiếu ánh sáng, sâu bệnh phát triển nhiều. Chỉ

để lại một nhánh gần chùm quả thứ nhất, các nhánh khác cần được tỉa bỏ. Cần tỉa lá già dưới gốc kịp thời để cây sinh trưởng tốt thêm nhiều quả.

### **5. Phòng trừ sâu bệnh**

Sâu xanh đục quả, sâu ăn lá, sâu xám, rầy xanh hại.

Phòng trừ: dùng các thuốc : Bi58, sheppa, Phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Các loại bệnh hại chính:

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh chết xanh, vi khuẩn gây hại:

Kịp thời phát hiện sớm nhổ bỏ những cây bị bệnh, đem tiêu hủy, hạn chế lây lan của bệnh, dùng các loại thuốc như Kasugamycin Ridomil, Rampart 35sc. Phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

-Bệnh đốm nâu:

Phòng trừ:

Thu dọn tàn dư cây sau mỗi vụ thu hoạch. Luân canh với các cây trồng khác họ.

- Dùng các loại thuốc Bordeaux + Zineb, Ridomil Gold 68 WP, Rampart 35sc...

Phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khi dùng thuốc BVTV cần đảm bảo thời gian cách ly trước thu hoạch, ưu tiên sử dụng các loại thuốc thảo mộc, thuốc sinh học để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm .

### **6. Thu hoạch**

Khi quả to, bánh tẻ tiến hành thu hái; cần thu 2-3 ngày thu một lần, vặt quả nhẹ nhàng, xếp vào thúng, rổ cứng có lót nhẹ, vận chuyển về kho, làm sạch, phân loại, bảo quản, đem tiêu thụ.